

- ① Le but de cette section est de résoudre un système d'éq. (S) i.e. déterminer l'ensemble W des solutions de (S).
- ② Deux systèmes (S) et (S') sont équivalents $\Leftrightarrow$ ils ont le même ensemble de solution W .
- ③ On peut écrire le système sous forme de matrice:

$$AX = B \text{ ou avec la matrice étendue } (A|B)$$

pro 3.34 Considérons (S) = $AX = B$. Si $M \in \mathbb{R}^{s \times s}$ est inversible, alors

$$MAX = MB$$

Co 3.35 Si on applique des transformations élémentaires de lignes à la matrice étendue d'un système d'équation linéaire, nous trouvons un système équivalent

CH 4 : ESPACES VECTORIELS

4.1 CORPS COMMUTATIFS

Def 4.1 Un corps commutatif ou un champ $\mathbb{K}$ est un ensemble, dont les éléments sont appelés nombres (ou scalaires), muni de deux opérations internes :

① Addition $+$: $\mathbb{K} \times \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}, (a, b) \mapsto a + b$

② Multiplication $\cdot$: $\mathbb{K} \times \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}, (a, b) \mapsto a \cdot b = ab$

et en possession de $0 \in \mathbb{K}$, appelé l'élément zéro, et $1 \in \mathbb{K}$, appelé l'unité, qui satisfont les propriétés suivantes :

[C1] addition associative : $\forall a, b, c \in \mathbb{K}, (a + b) + c = a + (b + c)$

[C2] 0 neutre pour l'addition : $\forall a \in \mathbb{K}, a + 0 = a = 0 + a$

[C3] $\exists$ inverse pour l'addition : $\forall a \in \mathbb{K}, \exists -a \in \mathbb{K} \mid a + (-a) = 0 = (-a) + a$

[C4] $+$ commutatif : $\forall a, b \in \mathbb{K}, a + b = b + a$

[C5] $\cdot$ associative : $\forall a, b, c \in \mathbb{K}, a(bc) = (ab)c$

[C6] 1 est le neutre de $\cdot$: $\forall a \in \mathbb{K}, 1a = a = a1$

[C7] $\cdot$ distributive $\forall +$: $\forall a, b, c \in \mathbb{K}, a(b+c) = ab+ac$ et $(a+b)c = ac+bc$

[C8] $\cdot$ commutative : $\forall a, b \in \mathbb{K}, ab = ba$

[C9] $\exists$ inverse pour $\cdot$: $\forall a \in \mathbb{K}_0, \exists a^{-1} \in \mathbb{K} \mid aa^{-1} = 1 = a^{-1}a$

- ⊙ Si $\mathbb{K}$ satisfait toutes les conditions sauf $[C8]$, on dit que $\mathbb{K}$ est un corps (non commutatif)
- ⊙ Si $\mathbb{K}$ satisfait toutes les conditions $[C1] \rightarrow [C7]$ on dit que $\mathbb{K}$ est un anneau. Si $\mathbb{K}$ satisfait aussi $[C8]$, alors c'est un anneau commutatif

4.2 DEFINITION D'ESPACE VECTORIEL

Def 4.3 Un espace vectoriel $(V, +, \cdot)$ sur un corps $\mathbb{K}$ est un ensemble V muni d'une loi interne $+: V \times V \rightarrow V$ appelé addition (somme) vectorielle et d'une opération $\cdot: V \times V \rightarrow V$ appelé la multiplication scalaire ($\lambda \vec{v} = \lambda \vec{v}$ où $\lambda \in \mathbb{K}, \vec{v} \in V$) et en possession d'un élément $\vec{0} \in V$ appelé vecteur zéro, qui satisfont les propriétés suivantes:

[EV1] associativité de $+$: $\forall \vec{v}, \vec{w}, \vec{u} \in V, \vec{v} + (\vec{w} + \vec{u}) = (\vec{v} + \vec{w}) + \vec{u}$

[EV2] $\vec{0}$ neutre pour $+$: $\forall \vec{v} \in V, \vec{v} + \vec{0} = \vec{v} = \vec{0} + \vec{v}$

[EV3] $\exists$ inverse pour $+$: $\forall \vec{v} \in V, \exists -\vec{v} \in V \mid \vec{v} + (-\vec{v}) = \vec{0} = (-\vec{v}) + \vec{v}$

[EV4] commutativité de $+$: $\forall \vec{v}, \vec{w} \in V, \vec{v} + \vec{w} = \vec{w} + \vec{v}$

[EV5] associativité mixte pour le produit scalaire: $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall \vec{v} \in V, \lambda(\mu \vec{v}) = (\lambda\mu) \vec{v}$

[EV6] distributivité de $\cdot$ scalaire par rapport à $+$ scalaire: $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall \vec{v} \in V, (\lambda + \mu) \vec{v} = \lambda \vec{v} + \mu \vec{v}$

[EV7] distributivité de la $\cdot$ scalaire par rapport à l'addition vectorielle: $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall \vec{v}, \vec{w} \in V, \lambda(\vec{v} + \vec{w}) = \lambda \vec{v} + \lambda \vec{w}$

[EV8] $1 \in \mathbb{K}$ est l'élément neutre pour $\cdot$ scalaire: $\forall \vec{v} \in V, 1 \vec{v} = \vec{v}$

⊙ Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, on parle d'un espace vectoriel réel

⊙ Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, on parle d'un espace vectoriel complexe

4.3

SOUS-ESPACES

Def 4.8

Un sous-espace (vectoriel) W d'un espace vectoriel V sur un corps $\mathbb{K}$ est un sous-ensemble W de V tq $(W, +, \cdot)$ avec l'addition et multiplication scalaire dans V est à nouveau un espace vectoriel

?

$$\rightarrow W \neq \{\emptyset\} \text{ et } \vec{0} \in W$$

Def 4.10

Soit V un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$. Si $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{K}$ et $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_r \in V$, le vecteur $\lambda_1 \vec{v}_1 + \dots + \lambda_r \vec{v}_r = \sum_{i=1}^r \lambda_i \vec{v}_i$ est une combinaison linéaire ou combili des vecteurs $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_r$

Pro 4.12

Soit W un sous-ensemble d'un espace vectoriel V sur un corps $\mathbb{K}$. Alors ces prop. sont équivalentes :

① W est un sous-espace vectoriel de V $\Leftrightarrow$

② W est non vide et $\forall \vec{v}, \vec{w} \in W$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, $\vec{v} + \vec{w} \in W$ et $\lambda \vec{v} \in W$

③ W est non vide et $\forall \vec{v}, \vec{w} \in W$, $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, la combili $\lambda \vec{v} + \mu \vec{w} \in W$.

④ W est non vide et $\forall \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_r \in W$, $\lambda_1 \vec{v}_1 + \dots + \lambda_r \vec{v}_r \in W$
 $\forall \lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{K}$,

DEMON

① $\Rightarrow$ ② : Si W est un S.E.V. de V , alors $\vec{0} \in W$, donc $W \neq \{\emptyset\}$

③ Comme W est un S.E.V. de V , il a la même $\cdot$ et $+$ que V et donc $\vec{v} + \vec{w} \in W$ et $\lambda \vec{v} \in W$.

① $\Leftarrow$ ② Pour un S.E. W non vide, ② $\Rightarrow$ que la $\cdot$ et la $+$ se restreignent à W . $\Rightarrow \exists \vec{w} \in W$ tq $0\vec{w} = \vec{0} \in W$.

Comme les éléments de $W \in V$, ils satisfont les conditions $\boxed{EV1} \rightarrow \boxed{EV8}$

② $\Rightarrow$ ③ on sait que $\forall \vec{v}, \vec{w} \in W$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, $\lambda \vec{v} \in W$ et $\mu \vec{w} \in W$ par ②. De plus par ①, leur somme est dans W .

③ $\Rightarrow$ ④ Par itérance de ② $\Rightarrow$ ③, $\sum_{i=1}^r \lambda_i \vec{v}_i \in W$

④ $\Rightarrow$ ② : ④ est un cas particulier de ③ : prenons $n=2$, $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$, on a $\vec{v} + \vec{w} \in W$. Et prenons $n=1$, $\lambda_1 = \lambda$ et $\vec{v}_1 = \vec{v}$, alors $\lambda \vec{v} \in W$

⑤ Exercice: $U \cap W \subset V$ est un sous espace

$U \cup W \subset V$ est un sous-espace $\Leftrightarrow \begin{cases} U \subset W \\ \text{ou} \\ W \subset U \end{cases}$

def 4.14

Soit V un espace vectoriel sur un corps K et $A \subseteq V$ un sous-ensemble de V . Le sous-espace vectoriel engendré par A (ou enveloppe linéaire de A) est le plus petit sous-espace W de V qui contient A . Il est noté $\langle A \rangle$ ou $\text{Vect}(A)$.

pro 4.15 Supposons que $A \neq \emptyset$. Alors $\text{Vect}(A) = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i \vec{v}_i \mid n \in \mathbb{N}_0, a_i \in K, \vec{v}_i \in A \right\}$
Si $A = \emptyset$, $\text{Vect}(A) = \{\vec{0}\}$

[A] Est-ce que $\text{Vect}(A) = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i \vec{v}_i \mid n \in \mathbb{N}_0, a_i \in K, \vec{v}_i \in A \right\}$ est un sous-espace de V ?

⊙ C'est un sous-ensemble de V . Et une combi d'une combi est une combi $\Rightarrow \text{Vect}(A)$ sous-espace de V

[B] $\text{Vect}(A)$ contient A ? oui: prenons $n=1$, $a_1=1$, alors $\vec{v} \in A = 1 \cdot \vec{v} \in \text{Vect}(A)$

[C] Le plus petit? oui car $\text{Vect}(A)$ est un S.E.V et contient les éléments de $A \rightarrow$ contient toutes les combis des éléments de A

[D] Si $A = \emptyset$, $\text{Vect}(A)$ étant un sous-espace vectoriel, il doit contenir $\vec{0}$.

Comme $A = \emptyset$, $\text{Vect}(A)$ ne contient rien d'autre $\Rightarrow \text{Vect}(A) = \{\vec{0}\}$

4.4 PRODUIT ET SOMME DIRECTE

Def 4.17 Soit V un espace vectoriel sur un corps K . Soient U et W deux sous-espaces de V . On dit que V est la somme directe de U et $W \Leftrightarrow$ ① $U \cap W = \{\vec{0}\}$ et ② $\text{Vect}(U \cup W) = V$
on écrit $V = U \oplus W$

pro 4.16 V est la somme directe de U et $W \Leftrightarrow$ tout les éléments de V s'écrivent d'une manière unique comme une somme d'un élément dans U et un élément dans W :

$$V = U \oplus W \Leftrightarrow \forall \vec{v} \in V, \exists! \vec{u} \in U, \exists! \vec{w} \in W: \vec{v} = \vec{u} + \vec{w}$$

DEMO

① Comme $V = U \oplus W \Rightarrow \exists \vec{u} \in U, \vec{w} \in W$ tq $\vec{u} + \vec{w} = \vec{v}, \forall \vec{v} \in V$

② Supposons par l'absurde que $\exists \vec{u}, \vec{u}' \in U$ et $\vec{w}, \vec{w}' \in W$ tq

$$\vec{u} + \vec{w} = \vec{v} = \vec{u}' + \vec{w}' \Leftrightarrow \underbrace{\vec{u} - \vec{u}'}_{\in U} = \underbrace{\vec{w}' - \vec{w}}_{\in W}$$

$$\text{Or, } U \cap W = \{\vec{0}\} \Rightarrow \vec{u} - \vec{u}' = \vec{0}$$

$$\text{et } \vec{w}' - \vec{w} = \vec{0} \Rightarrow \vec{w}' = \vec{w}$$

Alors, $\vec{u} = \vec{u}'$ et $\vec{w} = \vec{w}'$ et $\vec{u}$ et $\vec{w}$ sont unique

③ Supposons que $\exists! \vec{v} \in U, \exists! \vec{w} \in W$ tq $\vec{v} + \vec{w} = \vec{v}$ $\forall \vec{v} \in V$.

Alors $\vec{v} + \vec{w} \in U + W = \text{Vect}(U \cup W)$

④ Supposons $\vec{v} \in U \cap W$, alors $\vec{v} = \vec{v}^{\in U} + \vec{0}^{\in W} \Leftrightarrow \vec{v} = \vec{0}$
 $= \vec{0}^{\in U} + \vec{v}^{\in W}$

Pro 4.20

Soient V et W deux espaces vectoriels sur un corps $\mathbb{K}$.

?

Considérons l'ensemble $V \times W$, qui a comme élément $(\vec{v}, \vec{w})$, avec $\vec{v} \in V$ et $\vec{w} \in W$, muni des opérations suivantes:

$$(\vec{v}, \vec{w}) + (\vec{v}', \vec{w}') = (\vec{v} + \vec{v}', \vec{w} + \vec{w}')$$

$$\lambda (\vec{v}, \vec{w}) = (\lambda \vec{v}, \lambda \vec{w}) \quad \forall \vec{v}, \vec{v}' \in V, \lambda \in \mathbb{K}, \vec{w}, \vec{w}' \in W$$

Alors $V \times W$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

DEMO

Exercice: Tips: le vecteur neutre ici est $(\vec{0}, \vec{0})$

① L'espace vectoriel $V \times W$ est appelé produit direct de V et W

Th. 4.21

Considérons le produit direct $V \times W$ des espaces vectoriels V et W . Considérons $V' = \{(\vec{v}, \vec{0}) \mid \vec{v} \in V\} \subset V \times W$

$$W' = \{(\vec{0}, \vec{w}) \mid \vec{w} \in W\} \subset V \times W$$

Alors V' et W' sont des sous espaces vectoriels de $V \times W$

et $V \times W$ est la somme directe de V' et W' : $V \times W = V' \oplus W'$

DEMO

Observons que tout élément $(\vec{v}, \vec{w}) = (\vec{v}, \vec{0}) + (\vec{0}, \vec{w}) \in V \times W$ de manière unique car $V' \cap W' = \{(\vec{0}, \vec{0})\}$

Pro 4.22

Soit V un espace vectoriel avec des sous espace $W_1, W_2, \dots, W_n$. Alors les assertions suivantes sont équivalentes:

① $V = \text{Vect}(\bigcup_{i=1}^n W_i)$ et $W_i \cap W_j = \{\vec{0}\} \quad \forall i, j = 1, \dots, n$ avec $i \neq j$

② $\forall \vec{v} \in V, \exists! \vec{w}_i \in W_i$ (pour $i=1, \dots, n$) tq $\vec{v} = \vec{w}_1 + \dots + \vec{w}_n$

Dans ce cas, on dit que V est la somme directe des espaces $W_1, W_2, \dots, W_n$ et $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_n$

pro 4.23

Soit V un espace vectoriel avec une famille sous-espace $(W_i)_{i \in I}$, où I est un ensemble d'indices. Alors les assertions suivantes sont équivalentes:

① $V = \text{Vect}(\bigcup_{i \in I} W_i)$ $W_i \cap W_j = \{\vec{0}\}$

$\Rightarrow V$ est la somme directe des espaces $(W_i)_{i \in I}$:

② $\forall \vec{v} \in V, \exists! \vec{w}_i \in W_i \quad \vec{w}_i = \vec{0} \quad \forall i \in I$ et $\vec{v} = \sum_{i \in I} \vec{w}_i$ $V = \bigoplus_{i \in I} W_i$

Pro 4.25 Soient $V_1, \dots, V_n$ des espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$. Alors l'ensemble $V_1 \times \dots \times V_n = \{(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) \mid \vec{v}_i \in V_i, i=1, \dots, n\}$ muni des opérations $(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) + (\vec{v}'_1, \dots, \vec{v}'_n) = (\vec{v}_1 + \vec{v}'_1, \dots, \vec{v}_n + \vec{v}'_n)$ et $\lambda(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) = (\lambda \vec{v}_1, \dots, \lambda \vec{v}_n)$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$, appelé le produit direct des espaces $V_1, \dots, V_n$.

Pro 4.26 Soit $(V_i)_{i \in I}$ une famille des espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$, où I est un ensemble d'indices, alors l'ensemble $\prod_{i \in I} V_i = \{(\vec{v}_i)_{i \in I} \mid \vec{v}_i \in V_i, V_i \in I\}$ muni des opérations $(\vec{v}_i)_{i \in I} + (\vec{v}'_i)_{i \in I} = (\vec{v}_i + \vec{v}'_i)_{i \in I}$ et $\lambda(\vec{v}_i)_{i \in I} = (\lambda \vec{v}_i)_{i \in I}$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$, appelé le produit direct des espaces $(V_i)_{i \in I}$.

Le sous-ensemble $\coprod_{i \in I} V_i = \{(\vec{v}_i)_{i \in I} \mid \vec{v}_i = \vec{0}, \text{ sauf pour un nombre fini d'indice}\}$

est un sous-espace de $\prod_{i \in I} V_i$ que nous appelons coproduit des espaces $(V_i)_{i \in I}$.

4.5 GEOMETRIE AFFINE D'UN ESP. VECTORIEL

Def 4.27 Soit V un espace vectoriel. Une variété linéaire (non vide) L de V est un sous-ensemble de vecteurs V de la forme

$L = \vec{a} + W = \{\vec{a} + \vec{w} \mid \vec{w} \in W\}$ où W est un sous-espace vectoriel de V et $\vec{a}$ est un vecteur (fixé) de V . Par def., $\{\vec{0}\}$ est aussi une variété linéaire.

Le 4.28 Soient W un sous-espace d'un espace vectoriel V et $\vec{w} \in W$. Alors $\vec{w} + W = W$.

Pro 4.30 Soient V un espace vectoriel, $\vec{a}, \vec{a}' \in V$ et $W, W' \subset V$ des sous-espaces vectoriels. Alors les conditions suivantes sont équivalentes:

- ① $\vec{a} + W = \vec{a}' + W'$
- ② $W = W'$ et $\vec{a} - \vec{a}' \in W$

DEMO

① $\Rightarrow$ ②: Comme $\vec{a} = \vec{a} + \vec{0} \in \vec{a} + W = \vec{a}' + W'$, $\exists \vec{w}' \in W'$ tq $\vec{a} = \vec{a}' + \vec{w}'$. Alors, $\vec{a} - \vec{a}' = \vec{w}' \in W'$

De plus, $\forall \vec{w} \in W$, $\vec{a} + \vec{w} \in \vec{a} + W = \vec{a}' + W'$. Donc $\exists \vec{w}' \in W'$ tq $\vec{a} + \vec{w} = \vec{a}' + \vec{w}'$ et donc $\vec{w} = \vec{a}' - \vec{a} + \vec{w}' \in W'$

Alors $W \subseteq W'$ et $W' \subseteq W \Leftrightarrow W = W'$.

② $\Rightarrow$ ①: On a $\vec{a} + W' = \vec{a}' + \underbrace{(\vec{a} - \vec{a}') + W}_{=W} = \vec{a}' + W = \vec{a}' + W'$

Co 4.31

Soit $L = \vec{a} + W$ une variété linéaire, Alors $L = \vec{a}' + W$

$\forall \vec{a}' \in L$

DEMO

Soit $\vec{a}' \in L$, alors $\vec{a}' = \vec{a} + \vec{w}$ pour un certain $\vec{w} \in W$.

Alors $\vec{a}' + W \stackrel{4.29}{=} \vec{a} + \vec{w} + W = \vec{a} + W = L$

Pro 4.32

L'intersection d'une famille de variétés linéaires dans un espace vectoriel V est de nouveau une variété linéaire de V

Pour $L_i = \vec{a}_i + W_i$, $\bigcap_{i \in I} L_i$ est une var. linéaire.

DEMO

① Si $\bigcap_{i \in I} L_i = \emptyset$, alors $\bigcap_{i \in I} L_i$ est une variété linéaire par définition (4.27)

② Supposons $\exists \vec{b} \in \bigcap_{i \in I} L_i$. Alors (4.31) $L_i = \vec{b} + W_i \forall i \in I$.

Alors $\vec{z} \in \bigcap_{i \in I} L_i \Leftrightarrow \exists \vec{w}_i \in W_i \text{ tq } \vec{z} = \vec{b} + \vec{w}_i, \forall i \in I$

• Fixons $i_0 \in I$. Alors $\forall i \neq i_0, \vec{z} = \vec{b} + \vec{w}_{i_0} = \vec{b} + \vec{w}_i$ et donc

$\vec{w}_i = \vec{w}_{i_0} \Rightarrow \vec{w}_{i_0} \in \bigcap_{i \in I} W_i$ et donc $\vec{z} \in \vec{b} + \bigcap_{i \in I} W_i$

• On peut écrire $\bigcap_{i \in I} L_i = \vec{b} + \bigcap_{i \in I} W_i$ et donc $\bigcap_{i \in I} L_i$ est une variété linéaire car $\bigcap_{i \in I} W_i$ est un sous-espace vectoriel de V

Def 4.33

Soient $L = \vec{a} + W$ et $L' = \vec{a}' + W'$ deux variétés linéaires.

On dit que L est parallèle à L' ($L \parallel L'$) $\Leftrightarrow W \subseteq W'$ ou $W' \subseteq W$

CNS BASES ET DIMENSION

5.1 PARTIES GÉNÉRATRICES ET PARTIES LIBRES

Def 5.1

Un sous-ensemble $A \subseteq V$ est une partie génératrice de V si tout vecteur de V est combinaison de vecteurs de A : $\text{Vect}(A) = V$

① Soit A une partie génératrice infinie de V , alors on peut écrire $\vec{v} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \vec{a}_i$ avec $\lambda_i \in K$ et $\vec{a}_i \in A$. Mais si A est infini, on écrit $\vec{v} = \sum_{\vec{a} \in A} \lambda_{\vec{a}} \vec{a}$ où $\lambda_{\vec{a}} = 0$ pour tout $\vec{a}$ sauf un nombre fini de termes.